

وكالة الوزارة للزراعة
مركز البذور والتقاوي



وزارة البيئة والمياه والزراعة
Ministry of Environment Water & Agriculture



دليل تعريف الموارد
الوراثية النباتية للتين



المورد الوراثي
تين أسباني أصفر 2874

الإسم العربي
تين

الإسم الإنجليزي
Fig

الإسم العلمي
Ficus carica L.



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن تأقلم وانتشار المورد الوراثي:

شجرة متساقطة الأوراق قوية النمو - متوسطة إلى كبيرة الحجم، غزيرة المحصول ثمارها متوسطة الحجم، لونها أصفر، طلوة المذاق. تنتشر زراعة هذا الصنف في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية



مميزات المورد الوراثي

الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- شكل نصل الورقة: مفصصه (3 فصوص)
- كثافة التفرع: متوسط
- شكل الفرع عمر سنتين: منحنى
- طول نصل الورقة: طويل

الصفات الثمرية

- حجم الثمرة: متوسط
- شكل الثمرة: كروي
- عدد الثمار: متوسط
- طول الثمرة: متوسط
- عرض الثمرة: متوسط
- لون قشرة جلد الثمرة: أخضر مصفر

الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الثمار: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 40 - 50 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 40 - 50 كجم

الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (SST): 12-14 Brix°
- الحموضة (% titdicA): 0.21-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100جم): 8-9 mg



المورد الوراثي
تين أسود 2890

الإسم العربي
تين

الإسم الإنجليزي
Fig

الإسم العلمي
Ficus carica L.



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن تأقلم وانتشار المورد الوراثي:

شجرة متساقطة الأوراق قوية النمو - متوسطة الحجم، غزيرة المحصول ثمارها صغيرة الحجم، لونها أسود قرمزي، حلوة المذاق. تنتشر زراعة هذا الصنف في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية



مميزات المورد الوراثي

الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: شبه قائم
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- شكل نصل الورقة: مفصصة (5 فصوص)
- كثافة التفرع: متوسط
- شكل الفرع عمر سنتين: متعرج
- طول نصل الورقة: طويل

الصفات الثمرية

- حجم الثمرة: متوسط
- شكل الثمرة: كمثري
- عدد الثمار: متوسط
- طول الثمرة: متوسط
- عرض الثمرة: متوسط
- لون قشرة جلد الثمرة: أسود

الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الثمار: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 40 - 30 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 40 - 30 كجم

الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (SST): 12-14 Brix°
- الحموضة (% titdicA): 0.21-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100ج): 8-9 mg



المورد الوراثي
تين أسباني أسود 2890

الإسم العربي
تين

الإسم الإنجليزي
Fig

الإسم العلمي
Ficus carica L.



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن تأقلم وانتشار المورد الوراثي:

شجرة متساقطة الأوراق قوية النمو - متوسطة إلى كبيرة الحجم، غزيرة المحصول ثمارها متوسطة الحجم، لونها قرمزي أسود، طوة المذاق. تنتشر زراعة هذا الصنف في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية



مميزات المورد الوراثي

الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: قائم
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- شكل نصل الورقة: مفصصة (5 فصوص)
- كثافة التفرع: متوسط
- شكل الفرع عمر سنتين: متعرج
- طول نصل الورقة: طويل

الصفات الثمرية


- حجم الثمرة: متوسط
- شكل الثمرة: كمثري
- عدد الثمار: متوسط
- طول الثمرة: متوسط
- عرض الثمرة: متوسط
- لون قشرة جلد الثمرة: أسود

الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الثمار: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 40 - 60 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 40 - 50 كجم

الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (SST): 12-14 Brix°
- الحموضة (% ytidicA): 0.21-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100جم): 8-9 mg



المورد الوراثي تين بلدي 3110

الإسم العربي
تين

الإسم الإنجليزي
Fig

الإسم العلمي
Ficus carica L.



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن تأقلم وانتشار المورد الوراثي:

شجرة متساقطة الأوراق قوية النمو - متوسطة إلى كبيرة الحجم، غزيرة المحصول ثمارها متوسطة إلى صغيرة الحجم، لونها أسود قرمزي، حلوة المذاق. تنتشر زراعة هذا الصنف في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: شبه قائم
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- شكل نصل الورقة: مفصصة (5 فصوص)
- كثافة التفريع: متوسط
- شكل الفرع عمر سنتين: منحنى
- طول نصل الورقة: طويل

الصفات الثمرية


- حجم الثمرة: متوسط
- شكل الثمرة: كروي
- عدد الثمار: متوسط
- طول الثمرة: متوسط
- عرض الثمرة: متوسط
- لون قشرة جلد الثمرة: أسود

الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الثمار: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 40 - 50 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 30 - 50 كجم

الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (SST): 12-14 Brix°
- الحموضة (% titidicA): 0.21-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100جم): 8-9 mg



المورد الوراثي تين تايجر 2873

الإسم العربي
تين

الإسم الإنجليزي
Fig

الإسم العلمي
Ficus carica L.



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن أقلمه وانتشار المورد الوراثي:

شجرة متساقطة الأوراق قوية النمو - متوسطة إلى كبيرة الحجم، غزيرة المحصول ثمارها متوسطة الحجم، لونها أصفر وعليها خطوط طولية خضراء، طوة المذاق. تنتشر زراعة هذا الصنف في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: شبه قائم
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- شكل نصل الورقة: مفصصه (5 فصوص)
- كثافة التفريع: متوسط
- شكل الفرع عمر سنتين: منحنى
- طول نصل الورقة: طويل

الصفات الثمرية



- حجم الثمرة: كبير
- شكل الثمرة: كمثري
- عدد الثمار: متوسط
- طول الثمرة: متوسط
- عرض الثمرة: متوسط
- لون قشرة جلد الثمرة: أصفر مخضر

الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الثمار: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 40 - 60 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 20 - 30 كجم

الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (SST): 12-14 Brix°
- الحموضة (% titdicA): 0.21-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100جم): 8-9 mg



المورد الوراثي تين تركي براون 2888

الإسم العربي
تين

الإسم الإنجليزي
Fig

الإسم العلمي
Ficus carica L.



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن أقلمه وانتشار المورد الوراثي:

شجرة متساقطة الأوراق قوية النمو - متوسطة إلى كبيرة الحجم، غزيرة المحصول ثمارها كبيرة إلى متوسطة الحجم، لونها قرمزي، حلوة المذاق. تنتشر زراعة هذا الصنف في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية



مميزات المورد الوراثي

الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- شكل نصل الورقة: مفصصه (5 فصوص)
- كثافة التفريع: كثيف
- شكل الفرع عمر سنتين: متعرج
- طول نصل الورقة: طويل

الصفات الثمرية

- حجم الثمرة: متوسط
- شكل الثمرة: كمثري
- عدد الثمار: متوسط
- طول الثمرة: متوسط
- عرض الثمرة: متوسط
- لون قشرة جلد الثمرة: قرمزي

الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الثمار: مبكر
- متوسط وزن الثمرة: 40 - 60 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 50 - 60 كجم

الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (SST): 12-14 Brix°
- الحموضة (% ytidicA): 0.21-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100جم): 8-9 mg



المورد الوراثي تين سلطاني 2889

الإسم العربي
تين

الإسم الإنجليزي
Fig

الإسم العلمي
Ficus carica L.



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن أقلمه وانتشار المورد الوراثي:

شجرة متساقطة الأوراق قوية النمو - متوسطة إلى كبيرة الحجم، غزيرة المحصول ثمارها كبيرة إلى متوسطة الحجم، لونها قرمزي فاتح، طلوة المذاق. تنتشر زراعة هذا الصنف في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: شبه منتشر
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- شكل نصل الورقة: مفصصه (3 فصوص)
- كثافة التفرع: متناثر
- شكل الفرع عمر سنتين: منحنى
- طول نصل الورقة: طويل

الصفات الثمرية


- حجم الثمرة: متوسط
- شكل الثمرة: كمثري
- عدد الثمار: متوسط
- طول الثمرة: متوسط
- عرض الثمرة: متوسط
- لون قشرة جلد الثمرة: أخضر مصفر

الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الثمار: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 40 - 60 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 50 - 60 كجم

الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (SST): 12-14 Brix°
- الحموضة (% titidicA): 0.21-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100جم): 8-9 mg



المورد الوراثي تين حماط بلس 2860

الإسم العربي
تين

الإسم الإنجليزي
Fig

الإسم العلمي
Ficus carica L.



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن أقلمه وانتشار المورد الوراثي:

شجرة متساقطة الأوراق قوية النمو - متوسطة إلى كبيرة الحجم، غزيرة المحصول ثمارها صغيرة الحجم، لونها أسود قرمزي، طوة المذاق. تنتشر زراعة هذا الصنف في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية



مميزات المورد الوراثي الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: شبه قائم
- قوة نمو الشجرة: متوسط
- شكل نصل الورقة: نصل كامل غير مفصص
- كثافة التفريع: متوسط
- شكل الفرع عمر سنتين: متعرج
- طول نصل الورقة: طويل

الصفات الثمرية



- حجم الثمرة: صغير
- شكل الثمرة: كروي
- عدد الثمار: متوسط
- طول الثمرة: قصير
- عرض الثمرة: ضيق
- لون قشرة جلد الثمرة: أسود

الصفات المحصولية

- موعد بداية نضج الثمار: متوسط
- متوسط وزن الثمرة: 30 - 40 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 15 - 20 كجم

الصفات الكيميائية للثمار

- المواد الصلبة الذائبة الكلية (SST): 12-14 Brix°
- الحموضة (% ytidicA): 0.21-0.23
- فيتامين سي (ملجم/100جم): 8-9 mg



المورد الوراثي تين إسباني أخضر 2887

الإسم العربي
تين

الإسم الإنجليزي
Fig

الإسم العلمي
Ficus carica L.



التحمل للأمراض:

متوسط

نبذة عن أقلمه وانتشار المورد الوراثي:

صنف متواجد في عديد المحافظات بالمنطقة الشرقية. يتميز بأشجار متوسطة النمو ذات تفريع ضعيف إلى متوسط وشكل عام منتشر. ينتج ثمارا متوسطة الحجم وخضراء اللون عند النضج. موعده نضج الثمار موسمي ويعتبر إنتاج الشجرة متوسط إلى ضعيف. من أهم مميزات الصنف: جيد التأقلم مع البيئة الجافة والحارة للمنطقة الشرقية.



مميزات المورد الوراثي

الصفات المورفولوجية

- طبيعة نمو الشجرة: منتشر
- قوة نمو الشجرة: ضعيف إلى متوسط
- شكل نصل الورقة: مفصصة (5 فصوص)
- كثافة التفرع: ضعيف إلى متوسط
- شكل الفرع عمر سنتين: مستقيم
- طول نصل الورقة: متوسط

الصفات الثمرية


- حجم الثمرة: متوسط
- شكل الثمرة: منضغطة وغير متماثلة، بدون عنق واضح
- عدد الثمار: ضعيف إلى متوسط
- طول الثمرة: متوسط
- عرض الثمرة: عريض
- اللون الخارجي للثمرة: أخضر

الصفات المحصولية

- موعد نضج الثمار: موسمي
- متوسط وزن الثمرة: 45 إلى 75 جرام
- متوسط محصول الشجرة: 35 - 55 كجم

الصفات الكيميائية للثمار

- عصيرية الثمرة: منخفض
- المواد الصلبة الذائبة الكلية: منخفض إلى متوسط
- درجة الحموضة: منخفض





وزارة البيئة والمياه والزراعة

Ministry of Environment Water & Agriculture

